

MAXIDINA® Hospital

kód artiklu: A25001-2-3

TECHNICKÝ LIST**• VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU A OBLAST JEHO POUŽITÍ**

Přípravek Maxidina® Hospital je určen pro čištění a odstranění nepříjemného zápachu, které zvládne na jeden záťah. Složení bez parfémových složek je vhodné pro úklid nemocničních prostor i za přítomnosti pacientů.

Používá se jako běžný mycí prostředek a je jediným existujícím produktem na trhu, který nepříjemný zápach organického původu dokáže velmi rychle odstranit. Tento přípravek jen po jednom setření, díky čemuž lze zefektivnit pracovní tempo, naruší biofil, na kterém mohou zůstat zachycené mikroorganismy, zabrání mikrobiální (bakteriální a virové) kontaminaci a vyčistí povrch, jak vyžadují příslušné předpisy na celostátní úrovni, vydané Ministerstvem zdravotnictví, nebo na mezinárodní úrovni, vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Tento jedinečný kontaktně působící přípravek neobsahuje chlór, enzymy ani žádné jiné agresivní látky. Maxidina® Hospital lze použít na všechny omyvatelné povrchy např. skleněné a jiné stěny, nábytek, vybavení ambulancí, nemocničních pokojů a koupelen, lůžka, křesla, židle, stolky, policové vozíky a pomůcky.

• NÁVOD K POUŽITÍ

1 sáček přípravku Maxidina® Hospital vložte přímo do nádoby o 1 000 ml a doplňte čistou vodou. Sáček neotvírejte, protože je snadno rozpustný ve vodě. Vyčkejte několik minut, než bude produkt připraven k použití jako vodní mlha na ošetřovaný povrch. Přípravek Maxidina® Hospital lze použít v následujících 20 dnech. Poté jej doporučujeme vylít a připravit nový.

Přípravek Maxidina® Hospital nemíchejte s jinými přípravky.

• MANIPULACE A USKLADNĚNÍ

Nikdy se sáčků nedotýkejte mokřými rukavicemi nebo rukama! Obal nerozřezávejte, abyste mohli přípravek vylít, sáček je totiž snadno rozpustný ve vodě.

Výrobek skladujte v původním obalu, na suchém místě a mimo dosah dětí a přímého slunečního světla.

• SLOŽENÍ

Přípravek mimo jiné obsahuje: 30 % a více peroxodisíranu draselného (5 % aktivního kyslíku), 15 % i více, ale méně než 30 %, aniontových povrchově aktivních látek, hydrogenuhličitan sodný a parfémovou složku.

Balení obsahuje vysoušecí granule silikagelu.

• DOBA SKLADOVÁNÍ

5 let při skladování na suchém místě chráněném před zdroji tepla a světla.

• UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí 

Obsahuje peroxodisíran draselný. Při požití je škodlivý. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Vyhněte se vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice. Chraňte si oči a obličej.

Při vdechnutí vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu a poloze, která je pro dýchání pohodlná. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře. V případě podráždění kůže nebo vyrážky vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékaře. V případě respiračních příznaků, zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře. Výrobek a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Toxikologické středisko: 224 919 293.

Upozornění se týkají koncentrovaného produktu v prášku.